福山地区水産振興対策協議:平成23年度　広島県栄養塩調査結果　　第12報　　平成24年1月6日　（金）



まとめ：広島県農林水産局水産課

三態窒素合計値は除く全地点で3.0μg/l以下となっています。

早めの摘採を行うなど，漁場におけるノリの総量を抑制する必要があります。

水温は順調に低下し，昨年度並みです。

次回調査は平成24年1月10日を予定しています。

栄養塩調査結果　　採水年月日　平成24年1月5日　（木）　　分析機関：㈱エヌ・イーサポート

	場所名	採水時刻	天候	水温℃	昨年同期	窒素μg-at/l				昨年同期
					H23.1.6	アンモニア態	亜硝酸態	硝酸態	三態合計	H23.1.6
st.1	田尻	8:24	はれ	9.6	9.6	ND	ND	ND	0.0	1.6
st.2	鞆の浦	9:10	はれ	10.3	9.5	ND	0.1	0.9	1.0	2.1
st.3	田島	9:30	はれ	10.3	10.3	ND	ND	0.6	0.6	2.3
st.4	走島	8:38	はれ	10.7	11.0	ND	0.1	0.7	0.8	4.7
st.5	横田	9:40	はれ	11.0	10.4	0.6	0.2	2.2	3.0	1.9
st.6	大浦									
st.7	矢の島									