福山地区水産振興対策協議会　平成24年度　広島県栄養塩調査結果　　第10報　　平成24年12月6日　（木）

まとめ：広島県農林水産局水産課



三態窒素合計値は田尻と鞆の浦以外で3μg-at/lを下回っています。

水温は順調に低下しています。

珪藻類は田尻・鞆の浦・走島ではキートセロスが，田島・横田ではレプトシリンドルスが優占しています。

次回調査は平成24年12月11日を予定しています。

分析機関：㈱エヌ・イーサポート

栄養塩調査結果　　採水年月日　平成24年12月4日　（火）

	場所名	窒素μg-at/l				昨年同期
		アンモニア態	亜硝酸態	硝酸態	三態合計	H23.12.6
st.1	田尻	6.9	0.9	2.5	10.3	3.6
st.2	鞆の浦	3.1	0.8	2.3	6.2	3.1
st.3	田島	ND	0.8	1.4	2.2	2.1
st.4	走島	1.0	0.5	0.6	2.1	1.9
st.5	横田	ND	0.9	1.5	2.4	3.0
st.6	大浦					
st.7	矢の島					

珪藻プランクトン調査結果　　採水年月日　平成24年12月4日　（火）

	場所名	採水時刻	天候	水温℃	珪藻類（細胞数/ml）							昨年同期
					コシノディスカス	レプトシリンドルス	キートセロス	スケレトネマ	シュードニッチア	タラシオネマ	プレウロシグマ	水温℃
st.1	田尻	9:20	くもり	13.0	1	52	380	6		8	1	14.7
st.2	鞆の浦	10:30	くもり	15.0	1	198	265	11	9	14	1	15.7
st.3	田島	10:45	くもり	15.2	1	88	24	40			1	15.9
st.4	走島	9:10	くもり	14.5		8	40				1	15.9
st.5	横田	10:55	くもり	15.5	1	80	72					16.2
st.6	大浦											
st.7	矢の島											