福山地区水産振興対策協議会　平成24年度　広島県栄養塩調査結果　　第11報　　平成24年12月12日（水）

まとめ：広島県農林水産局水産課



三態窒素合計値は横田以外で減少し，田尻と鞆の浦では定量下限値未満でした。

これから収穫期を迎えますが，葉状体を長く伸ばしすぎないよう管理してください

水温は順調に低下し，昨年同期より1℃以上低い状態です。

珪藻類はキートセロスとレプトシリンドルスが優占しています。

次回調査は平成24年12月18日を予定しています。

分析機関：㈱エヌ・イーサポート

栄養塩調査結果　　採水年月日　平成24年12月11日　（火）

	場所名	窒素 μg-at/l				昨年同期
		アンモニア態	亜硝酸態	硝酸態	三態合計	H23.12.13
st.1	田尻	ND	ND	ND	0.0	2.2
st.2	鞆の浦	ND	ND	ND	0.0	0.0
st.3	田島	ND	0.4	1.4	1.8	0.0
st.4	走島	ND	0.4	1.1	1.5	0.0
st.5	横田	ND	0.4	2.6	3.0	2.4
st.6	大浦					
st.7	矢の島					

珪藻プランクトン調査結果　　採水年月日　平成24年12月11日　（火）

	場所名	採水時刻	天候	水温℃	珪藻類（細胞数/ml）							昨年同期
					コシノディスカス	ユーカンピア	レプトシリンドルス	キートセロス	シュードニッチア	バシラリア	スケレトネマ	水温℃
st.1	田尻	11:40	晴れ	12.0		6	150	100	8			13.0
st.2	鞆の浦	9:40	晴れ	12.9			180	60	10	60		14.6
st.3	田島	9:55	晴れ	13.4			48	10	12			14.8
st.4	走島	12:10	晴れ	13.0			2	25			4	14.2
st.5	横田	10:05	晴れ	13.9	1		12	13				15.2
st.6	大浦											
st.7	矢の島											