福山地区水産振興対策協議会　平成24年度　広島県栄養塩調査結果　　第15報　　平成25年1月17日　（木）

まとめ：広島県農林水産局水産課



三態窒素合計値は依然低い状態が続いています。
引き続き葉状体を長く伸ばしすぎないよう管理してください。

水温は概ね昨年並みの状態です。

珪藻類はキートセロスとスケレトネマ優占しています。

次回調査は平成25年1月22日を予定しています。

分析機関：㈱エヌ・イーサポート

栄養塩調査結果　　採水年月日　平成25年1月15日　（火）

	場所名	窒素 μg-at/l				昨年同期
		アンモニア態	亜硝酸態	硝酸態	三態合計	H24.1.17
st.1	田尻	ND	ND	0.6	0.6	3.2
st.2	鞆の浦	ND	0.1	0.9	1.0	0.0
st.3	田島	ND	0.2	1.7	1.9	5.5
st.4	走島	0.6	ND	0.8	1.4	0.0
st.5	横田	ND	0.2	2.6	2.8	4.9
st.6	大浦					
st.7	矢の島					

珪藻プランクトン調査結果　　採水年月日　平成25年1月15日　（火）

	場所名	採水時刻	天候	水温℃	珪藻類（細胞数/ml）							昨年同期
					コシノディスカス	ユーカンピア	キートセロス	スケレトネマ	タラシオシラ	ニッチア	プレウロシグマ	水温℃
st.1	田尻	7:50	くもり	8.3	1	19	338	504	27	22		8.4
st.2	鞆の浦	9:15	くもり	10.0			199	282	2		1	9.1
st.3	田島	9:30	くもり	10.8	3		98		13		1	11.6
st.4	走島	8:10	くもり	9.0	3	30	115	104	4	16	1	9.6
st.5	横田	9:40	くもり	11.0	2		160	6	1			11.8
st.6	大浦											
st.7	矢の島											