福山地区水産振興対策協議:平成23年度　広島県栄養塩調査結果　　第11報　　平成23年12月29日　（木）



まとめ: 広島県農林水産局水産課

三態窒素合計値は全地点で3.0μg/l以下となっています。

早めの摘採を行うなど，漁場におけるノリの総量を抑制する必要があります。

水温は順調に低下し，昨年度より1℃前後低くなっています。

次回調査は平成24年1月5日を予定しています。

栄養塩調査結果　　採水年月日　平成23年12月27日　（火）　　分析機関: ㈱エヌ・イーサポート

	場所名	採水時刻	天候	水温℃	昨年同期	窒素μg-at/l				昨年同期
					H22.12.24	アンモニア態	亜硝酸態	硝酸態	三態合計	H22.12.24
st.1	田尻	8:30	はれ	10.8	−	ND	0.2	ND	0.2	−
st.2	鞆の浦	9:15	はれ	11.9	12.7	ND	0.3	0.7	1.0	3.0
st.3	田島	9:30	はれ	12.0	13.3	ND	0.2	ND	0.2	4.0
st.4	走島	8:20	はれ	13.4	−	ND	0.3	1.2	1.5	−
st.5	横田	9:40	はれ	12.7	13.7	ND	0.3	2.2	2.5	3.7
st.6	大浦									
st.7	矢の島									