福山地区水産振興対策協議会　平成24年度　広島県栄養塩調査結果　　第8報　　平成24年11月22日（木）

まとめ：広島県農林水産局水産課



三態窒素合計値は前回より減少し，田尻・走島ともに3μg-at/lを下回っています。

水温は順調に低下しています。

珪藻類は重要種であるリゾソレニアが減少しましたが，最重要種であるコシノディスカスが増加しています。

次回調査は平成24年11月27日を予定しています。

分析機関：㈱エヌ・イーサポート

栄養塩調査結果　　採水年月日　平成24年11月20日　（火）

	場所名	窒素μg-at/l				昨年同期
		アンモニア態	亜硝酸態	硝酸態	三態合計	H23.11.22
st.1	田尻	ND	0.4	1.0	1.4	13.8
st.2	鞆の浦	—	—	—	—	13.2
st.3	田島	—	—	—	—	10.4
st.4	走島	ND	0.5	0.8	1.3	7.8
st.5	横田	—	—	—	—	9.8
st.6	大浦					
st.7	矢の島					

珪藻プランクトン調査結果　　採水年月日　平成24年11月20日　（火）

	場所名	採水時刻	天候	水温℃	珪藻類(細胞数/ml)							昨年同期
					コシノディスカス	キートセロス	スケレトネマ	シュードニッチア	アクティノプティクス	レプトシリンドルス	バシラリア	水温℃
st.1	田尻	7:00	晴れ	16.0	2	138	220	526	5	24		17.0
st.2	鞆の浦	—	晴れ	—								18.2
st.3	田島	—	晴れ	—								18.8
st.4	走島	7:29	晴れ	17.5	3	20		50	4	44	10	18.5
st.5	横田	—	晴れ	—								18.9
st.6	大浦											
st.7	矢の島											