福山地区水産振興対策協議会　平成24年度　広島県栄養塩調査結果　　第12報　　平成24年12月19日（水）

まとめ：広島県農林水産局水産課



三態窒素合計値は。

水温は順調に低下し，昨年同期より1℃以上低い状態です。

珪藻類は田尻と鞆の浦でスケレトネマが急増しています。
走島は非常に少ない状況です。

次回調査は平成24年12月25日を予定しています。

分析機関：㈱エヌ・イーサポート

栄養塩調査結果　　採水年月日　平成24年12月18日　（火）

	場所名	窒素 μg-at/l				昨年同期
		アンモニア態	亜硝酸態	硝酸態	三態合計	H23.12.20
st.1	田尻	1.3	0.3	1.8	3.4	0.0
st.2	鞆の浦	ND	0.2	1.2	1.4	0.1
st.3	田島	ND	0.2	0.8	1.0	0.8
st.4	走島	ND	0.4	1.3	1.7	2.0
st.5	横田	ND	0.3	1.5	1.8	4.3
st.6	大浦					
st.7	矢の島					

珪藻プランクトン調査結果　　採水年月日　平成24年12月18日　（火）

	場所名	採水時刻	天候	水温℃	珪藻類（細胞数/ml）							昨年同期
					コシノディスカス	キートセロス	スケレトネマ	レプトシリンドルス	タラシオシラ	バシラリア	グイナルディア	水温℃
st.1	田尻	11:50	くもり	－		72	368		24	40		12.8
st.2	鞆の浦	10:00	くもり	11.8		20	150	116	32			13.5
st.3	田島	10:20	くもり	12.5	1	62		36			40	14.0
st.4	走島	11:40	くもり	－			6					13.4
st.5	横田	10:30	くもり	13.0	1	16		24				14.5
st.6	大浦											
st.7	矢の島											